

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <p><b>NOISETIER VARIETE FERTILE DE COUTARD</b></p> |  |
|----------------------------------------------------|--|



|                                                                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAUTEUR ADULTE                                                                                | 2 à 3 m                                                                                                                          |
| LARGEUR ADULTE                                                                                | 1.50 à 2 m                                                                                                                       |
| FORME ADULTE                                                                                  | Érigée                                                                                                                           |
| UTILISATIONS                                                                                  | En haie brise-vent - En massif - En haie libre - En isolé - En milieu urbain - En groupe de 3 ou 5                               |
| CROISSANCE MOYENNE                                                                            | MOYENNE : 30 à plus de 40 cm par an dès 2 ans                                                                                    |
| DISTANCE DE PLANTATION                                                                        | Plantation en haie tous les 0,80 m                                                                                               |
| TYPE DE SOL  | Tout type - Sans humidité stagnante (sol bien drainé) - Pas trop sec                                                             |
| POLLINISATION                                                                                 | Planter à proximité d'un noisetier 'Segorbe', 'Butler', 'Gunslebert' ou 'Longue d'Espagne' pour assurer une bonne fructification |

## Variétés de Table

**Origine, aire de culture :** Très vieille variété sans doute originaire du Sud-Est de la France. Inscrite au Catalogue français des espèces et variétés fruitières en 1970. Présente fréquemment dans les jardins sous forme de touffes isolées, elle représente en 2003 15 % du verger français. Sous le nom de Barcelona elle constitue aussi une variété de base de la noiseraie d'Oregon. Connue en Espagne sous le nom de Castanyera et au Portugal sous celui de Grada di Viseu

**Caractéristiques agronomiques :** Arbre de vigueur forte. Port demi-érigé à demi-étalé. Ramification moyenne. Drageonnement important, surtout dans les jeunes vergers. Mise à fruit rapide. Productivité élevée.

Pourcentage de fruits vides non négligeable certaines années, aux environs de 10-12 %, lorsque les températures de la deuxième décade de juin sont fraîches.

Sensible à la bactériose après gelées de printemps, peu sensible au phytopte.

Débourrement assez précoce (mi-mars à Bordeaux) ; à ne pas planter en situation gélive.

Maturité assez tardive (première moitié de septembre à Bordeaux). Noisettes chutant en très grande majorité sans involucre.

**Biologie florale :** Variété homogame à légèrement protandre : floraison mâle assez précoce (dernière décade de décembre à fin janvier à Bordeaux), floraison femelle assez précoce (mi-décembre à deuxième décade de février à Bordeaux). Bonne floribondité mâle.

**Caractéristiques du fruit et de l'amandon :** Involucre : charnu, pubescent, légèrement plus long que le fruit, peu nervuré, assez échancré, moyennement denté, s'ouvrant largement à maturité. Callosité basale développée.

Noisette :1 à 5 fruits par inflorescence, le plus souvent groupés par 2 ou 3. Forme subsphérique, légèrement aplatie latéralement. Calibre assez homogène (généralement compris entre 20-22 mm), gros (3,2 à 4 g). Coque assez épaisse (1,4-1,5 mm), havane assez foncé, assez terne.

Amandon : forme assez irrégulière, subsphérique conique au sommet à légèrement ovoïde, légèrement compressé latéralement. Calibre assez homogène (principalement entre 15 et 16 mm), assez gros (1,3 à 1,7 g). Cavité interne généralement grande. Chair blanc ivoire, assez ferme, assez parfumée. Pellicule havane moyennement liégeuse, se mondant facilement. Pourcentage d'amandons doubles non négligeable (2-10 %). Rendement en amandon assez bas : 42 % (39-44 %).

**Appréciation générale :** Fertile de Coutard donne un fruit de table avec un rendement en amandon assez bas, de présentation moyenne du fait de son calibre seulement assez gros et de l'aspect foncé et assez terne de sa coque. Malgré sa bonne productivité, Fertile de Coutard a donc été depuis le début des années 80 supplantée en France par Ennis, et à partir de 1990 par Corabel®.

## L'essentiel en un coup d'oeil

## En bref

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE AU FROID | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| BESOIN EN EAU       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ENTRETIEN FACILE    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| CROISSANCE          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## Calendrier

Diagramme de planification des tâches de jardinage par mois et par semaine. Les mois sont indiqués en haut : J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D. Les tâches sont représentées par des carrés colorés : rose pour la floraison, orange pour la récolte, et vert pour la taille.

| Mois      | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floraison | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   | ■ |
| Récolte   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ■ |   |   |
| Taille    |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ |   |

■ FLORAISON ■ RÉCOLTE ■ TAILLE

### Environnement idéal



## CONSEILS ET ASTUCES

En hiver, griffer légèrement le sol pour favoriser l'élimination des nuisibles par les oiseaux

## ARROSAGE

Pour une bonne reprise racinaire, soyez plus particulièrement attentif à l'arrosage la première année et la suivante

### TAILLE - NETTOYAGE

Ne pas supprimer trop de grosses branches d'un coup - Tailler tous les 3-4 ans hors période de gel : supprimer les rameaux en surnombre et aérer le centre - Supprimer les rejets chaque année