

Pauetet VF

Variété de noisette



En résumé

Appréciation générale : Pauetet est une très bonne variété d'industrie du fait de sa productivité, de la qualité de son amandon et de son bon rendement au cassage. À ne pas planter en situation gélive, dans ce cas, lui préférer Segorbe.

J'AIME

- * Productivité
- * Très bonne aptitude pour l'industrie

JE N'AIME PAS

- * Craint les situations gélives
- * Arbre sensible au phytopte
- * Amandon fragile au cassage

DESTINATION : INDUSTRIE
ORIGINE : SEMIS NATUREL DE LA RÉGION D'ALCOVER, TARRAGONE, ESPAGNE
DÉVIROSÉ PAR LE CTIFL À PARTIR DU CLONE N 363

ÉDITEUR : VARIÉTÉ LIBRE
INSCRIT CTPS DEPUIS 1987
CERTIFICATION INFEL : 733.

LE FRUIT

Involucre : trapu, très pubescent, moyennement nervuré, légèrement plus long que le fruit, peu denté, peu échanuré, s'ouvrant à maturité. Callosité basale développée.

Noisette : 1 à 5 fruits par inflorescence, le plus souvent groupés par 2 ou 3. Forme homogène, très légèrement ovoïde. Calibre très homogène, (généralement compris entre 16 et 18 mm), petit (1,9 à 2,4 g). Coque fine (1,1 à 1,2 mm), de couleur havane foncé, assez terne.

Amandon : forme très homogène, subsphérique à très légèrement ovoïde. Calibre très homogène, généralement compris entre 11 et 15 mm, petit (0,9 à 1,2 g). Très turgescents. Cavité interne moyenne. Chair blanc ivoire, très ferme, parfumée, amandon fragile au cassage. Pellicule havane, liégeuse mais fibres très fines s'éliminant en grande partie au cassage puis au calibrage. Aptitude au mondage généralement bonne. Pas d'amandon double. Rendement en amandon élevé : 48 % (46-50 %).

PRODUCTION - RÉCOLTE

Très bonne productivité et très faible pourcentage de fruits vides.

L'arbre

- Vigueur : très forte
- Port : demi-érigé à érigé
- Ramification : moyenne
- Drageonnement moyen à assez faible
- Époque de maturité : moyenne, 4 jours avant Fertile de Coutard (10-15 septembre à Bordeaux)
- Régularité de production : mise à fruit assez rapide, rapide si la vigueur n'est pas excessive (taille légère, fumure modérée)
- Débourrement assez précoce vers la mi-mars à Bordeaux soit en moyenne deux jours avant Fertile de Coutard ; à ne pas planter en situation gélive
- Biologie florale : variété homogame à légèrement protogyne : floraison mâle moyenne (deuxième décennie de janvier à première décennie de février à Bordeaux) ; floraison femelle assez précoce (mi-décembre à deuxième décennie de février à Bordeaux)
- Floribondité mâle assez bonne à bonne.
- Pollinisation : formule d'incompatibilité pollinique : S18, S22, compatible avec toutes les variétés cultivées en France. Pollinisée en début de floraison par Segorbe (S9, S23) et Tonda di Giffoni (S2, S23), en première partie de pleine floraison par Butler (S3, S2) et Ennis (S1, S11), en deuxième partie de pleine floraison et fin floraison par Jemtegaard 5 (S3, S2), Merveille de Bollwiller (S5, S15) et Corabel® (S3, S1)

La conduite

PLANTATION

Distances conseillées : 5 x 3 m ou mieux 6 x 3 m ou 6 x 2,5 m.

TAILLE ET CONDUITE

Formation en gobelet à 3 ou 4 charpentières. Assez peu drageonnant.

RÉCOLTE

En deux passages, maturité groupée, noisettes chutant librement sans involucre.

SÉCHAGE

Moins de 12 % d'humidité (généralement 7-8 %) pour les

noisettes en coque et moins de 7 % pour les amandons (généralement 4,5 %).

CONSERVATION

En coque à moins de 21 °C et de 65 % d'humidité relative, en amandon le moins longtemps possible à moins de 17 °C.

CONSERVATION

Assez peu sensible à l'antracnose, sensible à la bactériose en cas de gelées printanières, moyennement sensible au phytopte.



Ctifl



RENSEIGNEMENTS CTIFL
CENTRE DE LANXADE
28 ROUTE DES NEBOUTS
24130 PRIGONRIEUX
TÉL. : 05 53 58 00 05

CES RÉSULTATS SONT ISSUS DES TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LE CADRE DE LA CHARTE
NATIONALE FNPF/CE/INRA/CTIFL
ET STATIONS RÉGIONALES